

血行促進・皮膚保湿剤

患者さまへ

ビーソフテン[®]ローション0.3%の使い方



- このおくすりは皮膚の水分を保持し潤いを保ちます。
- 2回振り出した量(約0.5g)は大人の手のひら2つ分の面積に塗布できます。



ご使用に際しての注意

- 目の中や目の周辺には塗らないでください。
万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。
- 傷口や皮膚のただれているところ(潰瘍やびらん)には塗らないでください。
- 皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 耳や鼻の中に入らないように注意してください。
- 使用した後は、しっかりキャップを閉め、なるべく涼しいところに保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。



(工場用コード)



●医師の指示に従い

1日に1～数回(朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など)
適量を患部にのばすように塗ってください。

おくすりの 塗り方の目安

入浴後
5分以内が
効果的

- かゆみは皮膚の乾燥とともに出てきます。
お風呂上がりやシャワーの後に水滴を拭き取り、5分以内に塗り付けて擦り込むと効果的です。

指先ではなく
手のひらで
塗ります

- 塗り残しがないように手のひらで患部全体に塗ってください。

身体の
しわの方向に
塗ります

- おくすりは、皮膚のしわの方向(骨に対して横向きの方向)にそって塗ると皮膚全体に広がりやすくなります。

「外用薬の正しい使い方(九州大学大学院 皮膚科学 古江増隆教授 監修)」より一部転載



帝國製薬株式会社