


ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「テイコク」を 使用されている方へ

- このおくすりは
皮膚の水分を保持し
潤いを保ちます。
- 4回の噴霧量
(約0.5g)は大人の
手のひら2つ分です。



ご使用に際しての注意

- 耳や鼻の中に入らないように注意してください。
また、傷口や皮膚のただれているところ(潰瘍やびらん面)には
噴霧しないでください。
- 皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、直ち
に使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 目の中や目の周辺には噴霧しないでください。万一、目の中
に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があ
れば医師にご相談ください。
- 吸入する可能性があるので、顔面や頭部等には注意して噴霧
してください。
- 初めて使用する際は、真つすぐ立てて4~5回空噴霧した後、使
用してください。

- 使用した後は噴霧口を拭き
取り、付属のキャップをして、
なるべく涼しいところで保管
してください。



(工場用コード)



- 医師の指示に従い1日に1～数回
(朝、昼、夕方、お風呂上がり、寝る前など)
適量を患部に噴霧してください。

- 患部から約10cm離して噴霧してください。



おくすりの 塗り方の目安

入浴後5分以内 が効果的

- かゆみは皮膚の乾燥とともに
出てきます。
お風呂上がりやシャワーの後
に水滴を拭き取り、5分以内に
噴霧すると効果的です。



「外用薬の正しい使い方(九州大学大学院 皮膚科学 古江増隆教授 監修)」より一部転載

- 噴霧できなくなる恐れがありますので、針のような
もので突くなどして噴霧口にキズをつけないでくだ
さい。
- お子様の手が届かないところに保管してください。

