

# ケトプロフェンテープ40mg「泰イコク」をご使用の患者さんへ

このくすりを貼付していた部位に発疹・発赤、かゆみ、腫れなどの症状がみられる、**接触皮膚炎**又は**光線過敏症**が起き、全身へ広がる重篤な例が報告されています。

## 1. 次の方は使用前に必ず主治医又は薬剤師にご相談ください。


- (1) 光線過敏症と診断されたことがある人
- (2) 医薬品や化粧品、日焼け止め等で過敏症を起こしたことがある人

## 2. 発疹・発赤、かゆみ、腫れなどの異常があらわれたら、すぐに使用を中止し患部を遮光して主治医又は皮膚科専門医にご相談ください。

## 3. 使用中及び使用後は、紫外線に当たらないようにしてください。


- (1) 戸外へ出るときは天候にかかわらず、濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し貼付部を**紫外線**に当てないでください。なお、白い生地や薄手の服では**紫外線**が透過するおそれがあります。
- (2) 海水浴や炎天下での作業、ゴルフ、テニスなど屋外スポーツをしないでください。
- (3) はがした後も、少なくとも4週間は衣服、サポーター等により**紫外線**に当てないでください。

例) 腰に貼った場合




●妊娠後期の女性は使用しないでください。


# ケトプロフェンテープ40mg「ティコク」の上手な貼り方



はじめに2つに折り曲げ  
①をはがし患部にはります。



②または③のフィルムを  
はがしながらはります。



残りのフィルムを  
はがしながらはります。

薬袋の裏の「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。発疹・発赤、かゆみ、腫れなどの異常があらわれたら、すぐに使用を中止し患部を遮光して主治医又は皮膚科専門医にご相談ください。