

ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」をご使用の患者さんへ

このくすりを貼付していた部位に発疹・発赤、かゆみ、腫れなどの症状がみられる、**接触皮膚炎**又は**光線過敏症**が起き、全身へ広がる重篤な例が報告されています。

1. 次の方は使用前に必ず主治医又は薬剤師にご相談ください。


- (1) 光線過敏症と診断されたことがある人
- (2) 医薬品や化粧品、日焼け止め等で過敏症を起こしたことがある人

2. 発疹・発赤、かゆみ、腫れなどの異常があらわれたら、すぐに使用を中止し患部を遮光して主治医又は皮膚科専門医にご相談ください。

3. 使用中及び使用後は紫外線にあたらないようにしてください。


- (1) 戸外での作業や屋外スポーツをするときは、天候にかかわらず濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し紫外線にあたらないようにしてください。
白い生地や薄手の服は紫外線が透過するおそれがありますのでご注意ください。
- (2) はがした後も少なくとも4週間は、衣服、サポーター等を着用し紫外線にあたらないようにしてください。

例) 腰に貼った場合




●妊娠後期の女性は使用しないでください。


ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」の上手な貼り方



上側のフィルムを半分まではがし、薬面を患部に貼ります。



途中まではがしたフィルムの端を持ち、はがしながら貼ります。



下側のフィルムも同様に、はがしながら貼ります。

直射日光や高温の場所をさけて涼しい所に保管してください。

薬袋の裏の「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

発疹・発赤、かゆみ、腫れなどの異常があらわれたら、すぐに使用を中止し患部を遮光して主治医又は皮膚科専門医にご相談ください。



帝國製薬株式会社